

# DETERMINE™ HBsAg 2


GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

## Antes de empezar


- Lea las instrucciones de uso antes de utilizarla.
- Reúna los materiales necesarios.
- Cubra el espacio de trabajo con una funda limpia, desechable y absorbente.
- Póngase los guantes desechables.
- El tampón de detección debe estar a temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar el análisis.

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte las instrucciones de uso.

- 1** Prepare la prueba  
Separe una tira de la derecha y quitele la lámina que la recubre.



- 2** Coloque la prueba  
Coloque la tira en una superficie plana donde vaya a realizar la prueba.



- 3** Añadir tipo de muestra 1  
*Sangre completa de venopunción*  
Agregue 50 µl de sangre entera (pipeta de precisión) a la almohadilla de muestra. Espere 1 minuto y añada una gota de tampón de detección.



- Añadir tipo de muestra 2  
*Sangre entera de punción digital*  
Agregue 50 µl de sangre entera a la almohadilla de muestra. Cuando toda la sangre se haya transferido del tubo capilar al centro de la almohadilla de muestra, aplique de inmediato una gota de tampón de detección a la almohadilla.



**Precaución:** No levante el tubo capilar de la almohadilla de muestra hasta que no se haya transferido toda la sangre.



- 4** Interprete los resultados  
Interprete el resultado de la prueba entre 15 y 30 minutos después de añadir la muestra. *No lea los resultados de la prueba después de 30 minutos.* Todos los resultados deben mostrar una línea de control. Si no aparece, los resultados no son válidos y la prueba deberá repetirse. Interprete cualquier barra visible (por más tenue que sea) de la ventana como un resultado válido.

